



**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
ПІВНІЧНОГО СХОДУ**



вулиця Паркова, 3, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343  
тел. (0542) 695-002, e-mail: agronauka@gmail.com

## **КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН  
з мережею державних підприємств  
пропонує насіння кращих сортів ярих культур під урожай 2024 року**

Культура	Сорт	Генерація	Ціна з ПДВ, грн./т
Гречка	Ярославна	РР-2	договірна
		еліта	договірна
		СН-I	договірна
	Селяночка	РР-2	договірна
		еліта	договірна
	Слобожанка	РР-2	договірна
еліта		договірна	
Коноплі посівні	Софія	еліта	договірна
		СН-I	договірна
Ячмінь ярий	Святовит	еліта	договірна
		СН-I	договірна
Овес	Парламентський	с-еліта	договірна
		СН II	договірна

Насіння очищене, затароване в п/п мішки (40-50 кг),  
промарковане та сертифіковане за умовами ДСТУ 2240-93.

### **З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ НАСІННЯ ЗВЕРТАТИСЬ**

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН  
42343, Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. Зелена, 1  
(050) 174-67-94 - Микола Геннадійович  
(066) 048-20-25 - Володимир Ілліч  
(095) 418-46-76 - Віталій Вікторович  
(095) 657-10-15 - Роман Миколайович  
(066) 915-74-97 - Тетяна Михайлівна

Директор Інституту  
сільського господарства  
Північного Сходу НААН

Кабанець В.М.

## **Гречка їстівна СЛОБОЖАНКА**

Звичайний (індетермінантний) морфотип.

Створений від схрещування сортів (Астра х Колективна) з подальшим індивідуально-сімейним доббором на продуктивність (озерненість, маса 1000 зерен).

Різновидність - алята.

Середньостиглий (вегетаційний період – 80-85 діб). Стійкість до осипання – середня, посухостійкість – підвищена, суцвіття – щиток. Маса 1000 насінин – 28,4 г. Плівчастість – 19,8 %.

Технологічні та круп'яні якості відмінні. Вирівняність зерна 85-88 %, вихід крупи 74-77 %, вміст білку – 16,0 %.

Рекомендована норма висіву 3,5 млн. схожих зерен на 1 га при суцільній сівбі та 2,2 млн. – при широкорядній.

За роки вирощування на сортодільницях Сумської та Чернігівської областей забезпечив врожайність 29,0 – 30,0 ц/га, Ужгородської області – 32,7 ц/га.

## **Гречка їстівна ЯРОСЛАВНА**

Детермінантний морфотип.

Створений від схрещування сортів (Іванна х Триумф) х зразками колекції ВІРа (К-4181 х К-4312) з подальшим індивідуально-сімейним доббором на продуктивність, озерненість, дружність дозрівання і детермінантність.

Різновидність – алята.

Ранньостиглий – вегетаційний період 75-80 діб. Висота рослин 90-105 см, рослини добре облиствені, гіллясті. На основному стеблі 6-7 вузлів. Верхнє суцвіття пагона закінчується китицею, зустрічаються суцвіття з виделкоподібними китицями. Форма китиці вузькоциліндрична. Рослини за габітусом – компактні. Листки широкі, середньої товщини, квітки білі, зрідка блідо-рожеві. Плоди великі, крилаті. Маса 1000 зерен – 30 г, вміст білку – 15-16 %, натура зерна - 600 г/л, плівчастість – 20,1 %, вихід крупи – 78-80 %, вирівняність зерна – 85-90 %.

Рекомендована норма висіву – 3,5 млн. схожих зерен на 1 га при суцільній сівбі та 2,2 млн. – при широкорядній.

При вирощуванні на сортодільницях України сорт забезпечив урожайність 30-35 ц/га.

## **Гречка їстівна СЕЛЯНОЧКА**

Детермінантний морфотип.

Створений від схрещування сортів (Сумчанка х Іванна) х зразками колекції ВІРа (К-3764 х К-3785) з подальшим індивідуальним добором на детермінантність, крупнозерність і високу продуктивність.

Різновидність – алята.

Ранньостиглий – вегетаційний період 75-80 діб. Висота рослин 90-105 см. Стійкість до осипання вища середньої, посухостійкість підвищена. Маса 1000 зерен – 28-29 г, вміст білку – 15-16 %, натура зерна – 560-580 г/л, плівчастість – 21-22 %, вихід крупи – 80-85 %, вирівняність зерна – 80-85 %.

Рекомендована норма висіву 3,5 млн. схожих зерен на 1 га при суцільній сівбі та 2,2 млн. – при широкорядній.

При вирощуванні на сортодільницях України сорт забезпечив урожайність 30-35 ц/га.

## **Ячмінь ярий СВЯТОВИТ**

Оригінатор - Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннезнавства та сортовивчення НААН

Посухостійкий (9 балів). Вирізняється густим, міцним стеблостоем. Висота рослин – 77 см, стійкий до полягання (9 балів) та осипання зерна;

Середньостиглий, вегетаційний період (74 - 77 днів);

Високостійкий до борошнистої роси (9 балів), гельмінтоспоріозу (7 – 9 балів), за роки вивчення не вражався сажковими хворобами;

Вирівняність зерна – 94 - 96%. Вміст білка – 11,4%, екстрактивність – 78 - 80%.

Різновидність – nutans.

Колос дворядний, середньої довжини – 8 – 10 см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, циліндричної форми.

Ості довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні солом'яно-жовтого кольору. Колоскова луска вузька, без опушення. Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зерно велике, жовте, ромбічної форми. Маса 1000 зерен 48 - 54 г.

У сортовипробуванні інституту за 3 роки середній врожай - 5,61 т/га, перевага над стандартом склала 11 - 18%;

Рекомендований для всіх зон України, пивоварний.

## Овес посівний ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ

Оригіатор – Носівська селекційно-дослідна станція НААН.

Сорт Парламентський – це гібрид сортів Чернігівський і Ранньостиглий, який отримав кращі батьківські ознаки і високу продуктивність.

Якість зерна відповідає стандартам сортів зернового напрямку, містить 12,4-12,8% білка.

Різновид – мутіка. Середньостиглий (90-100 днів). Висота рослини 110-112 см. Плівчастість 24-26%. Маса 1000 зерен 36-40 г

Стійкий до посухи, осипання, типових хвороб, шведської мухи.

Урожайність 6,9-7,0 т/га.

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп.

## Коноплі посівні СОФІЯ

Оригіатор: Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.

Сорт зареєстровано в Україні у 2021 році.

Створено методом добору із сорто-популяції Глесія з подальшим сімейно-груповим відбором із попередньою оцінкою генотипу на покращення господарсько-цінних ознак.

Основні ознаки: однодомні посівні коноплі, універсальні у напрямі вирощування, середньоранні, вміст ТГК до 0,08 %.

*Господарські та біологічні характеристики:*

Напрямок вирощування	Природно-кліматична зона	Тривалість періоду вегетації, днів	Потенційна урожайність, т/га		Вміст олії, %	Вміст волокна, %
			зерна	трести		
Товарне зерно	Степ, Лісостеп, Полісся	120-125	2,1	-	31-34	-
Двобічне використання		120-125	2,0	7,0		30-35
Волокно (зеленець)		87-92	-	10,0	-	35-38

*Агротехнічні умови:*

Сорт інтенсивного типу, технологія вирощування розробляється співробітниками Інституту СГПС НААН для конкретних умов господарства.

Напрямок вирощування	Спосіб посіву	Ширина міжряддя, см	Норма висіву насіння, млн. сх. насінин/га
Товарне зерно	Широкорядний	70, 45	0,5-0,8
Двобічне використання	Широкорядний, звичайний рядковий	45, 15	1,2-2,5
Волокно (зеленець)	Звичайний рядковий	15, 12,5	4-4,5

Стійкість до: збудників хвороб, бал (1-9): фузаріоз (*Fusarium sp.*) – 8; комах-шкідників, бал (1-9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuate Koch.*) – 8; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis Hb.*) – 7.