

ІНФОРМАЦІЯ
по стану рослин в зоні діяльності Інституту сільського
господарства Північного Сходу НААН
на 02 липня 2025 року

На кінець третьої декади червня спостерігалось ясне небо іноді злегка хмарне. Середньодобова температура повітря становила 17,7⁰С. В денні години стовпчик термометра піднімався до позначки 26,0⁰С (28.06) в повітрі та до 36⁰С на поверхні ґрунту. Зниження температури спостерігалось у повітрі до 12,0⁰С (30.06), на поверхні ґрунту до 10⁰С (27, 30.06). Вітер переважав південно-західний 5-6 м/с. Відносна вологість повітря знижувалася до 84%. Середня температура ґрунту на глибині 5 см та 40 см становила 18,4 і 18,5 ⁰С відповідно. Опадів за цей час випало 7,7 мм.

На початок першої декади липня прогнозується значне потепління на декілька днів. Вдень переважно сонячно. Можливі короткочасні дощі.

Озимі зернові. Посіви озимих культур перебувають у доброму та задовільному стані. Однак, фітосанітарний стан потребує постійного моніторингу. У озимих зернових триває фаза дозрівання. В залежності від строку сівби рослини проходять період пізньої молочної та ранньої тістової стиглості, що за всесвітньою шкалою фаз росту і розвитку рослин відповідає (ВВСН 77-83). Ячмінь озимий ранніх та оптимальних строків сівби (20 вересня-01 жовтня) перебуває у фазі дозрівання (ВВСН 83-87). Низькі температури можуть затримати дозрівання, що призведе до пізнього старту збиральної кампанії. Повна стиглість зерна пшениці озимої очікується 18-20 липня.

На сьогоднішній день на посівах озимини відмічено наявність шкідників - п'явиця, хлібні трипси, хлібний жук, що створює небезпеку їх інтенсивного розмноження та значної шкодочинності. Необхідно застосувати інсектициди, в першу чергу на насінницьких посівах. Найвища концентрація фітофагів наразі спостерігатися по краях полів.

На насінницьких посівах слід проводити сортову та видову прополки.

Ярі зернові. На більшості площ посіяних в ранні і оптимальні строк рослин ячменю ярого, пшениці ярої та вівса триває фаза колосіння – наливу зернівки. Основним на сьогодні на посівах даних культур є спостереження за наявністю шкідників та хвороб. Занепокоєння може викликати фітосанітарний стан посівів, що обумовлюється погодними умовами, тому посіви ярих необхідно своєчасно обробляти фунгіцидами та інсектицидами. Зараз на посівах ярих культур ураження посівів хворобами не відмічено більше, ніж економічний поріг шкодочинності.

Соя. На більшості площ у третій декаді червня рослини сої знаходяться у фазі бутонізації – початку цвітіння. До цієї фази відбувається активне формування кореневої системи та нарощується надземна маса рослин. В період бутонізації – початку цвітіння застосування гербіцидів проти дводольних бур'янів не рекомендоване. Проти однорічних злакових бур'янів не пізніше до початку цвітіння слід застосовувати гербіциди на основі однієї із діючих речовин: хізалофоп-п-етил, флуазифоп-п-бутил, клетодиму, імазетапіру, імазамоксу та ін., які включено до «Переліку...».

Посіви на яких рослини відчувають недостатнє живлення потрібно обробити мікродобривами, що підвищить інтенсивність фотосинтезу, стійкість до

несприятливих погодних та ґрунтових умов, зніме фітотоксичну дію гербіцидів. Запобігає фізіологічним хворобам, які викликані дефіцитом окремих елементів живлення (хлорози, некрози та ін.). Завдяки цьому буде активізовано утворення та функціонування бульбочок, а також забезпечено збільшення кількості квіток, бобів і насінин у кожному бобі.

Соняшник. Посіви соняшнику (висіяні в оптимальні терміни) знаходяться на початку фази бутонізації. Спостерігається затримка із розвитком та нормативними термінами початку цвітіння на 7-10 днів. Знижені добові температури травня та перших декад червня зумовили ризик поширення хвороб, але за умови збереження показників температури на рівні 3 декади червня очікується стабілізація фітосанітарного стану посівів.

Планові заходи догляду за посівами включають обробку фунгіцидами системної дії, комплексними мікродобривами, контроль розвитку і поширення попелиці.

Загалом динаміка та рівень вегетативного розвитку рослин (та очікуваний рівень урожайності) на рівні минулого 2024 року

Гречка. В області, в основному, знаходиться у фазі цвітіння. Значна кількість опадів позитивно вплинула на ріст і розвиток рослин гречки. Порівняно невисока температура у ранковий період сприяє інтенсивному запиленню рослин гречки комахами.

Формування повноцінного врожаю гречки як перехреснозапильної ентомофільної культури відбувається при достатній кількості бджіл. При можливості для забезпечення бджолозапилення гречки перед початком цвітіння слід підвезти пасіку з розрахунку 2-3 бджолосім'ї на гектар посіву.

Коноплі. На переважній кількості площ в області коноплі перебувають у фазі бутонізації. На насіннєвих посівах рекомендуємо розпочати внутрішньовидові прополки для видалення рослин плосконі з посівів.

Опади, що випали на останню декаду сприяють інтенсивному росту рослин і видовженню стебел.

Заступник директора з наукової роботи

Микола СОБКО